

## Annexe 2 : Typologie des urgences pédiatriques et degré d'urgence \*

### ➤ Chirurgie viscérale

Il convient de séparer les urgences non traumatiques des urgences traumatiques.

### ➤ Les urgences non traumatiques

Toutes les pathologies 'ischémiques' d'organe sont une urgence chirurgicale absolue : volvulus du grêle (vomissements verts), invagination intestinale non réduite, torsion du testicule chez le garçon, torsion d'annexe chez la fille, hernie inguinale étranglée.

Les péritonites par perforation d'organe creux ou par diffusion à partir d'un abcès appendiculaire constituent également une urgence chirurgicale qui doit être opérée rapidement. Il en est de même pour la péritonite et/ou le syndrome occlusif accompagnant une entérocolite ulcéro-nécrosante chez le nouveau-né prématuré.

Les occlusions basses (maladie de Hirshprung, iléus méconial) doivent être rapidement dérivées en cas de sepsis associé.

Par contre, les sténoses du pylore ou les hémorragies d'un diverticule de Meckel peuvent être décalées au lendemain. De même, cholécystite aiguë, pancréatite aiguë doivent bénéficier d'une stabilisation médicale avant une intervention éventuelle.

### ➤ Les urgences traumatiques

Tout dépend des lésions associées, notamment neurologiques et respiratoires. Les enfants polytraumatisés sont transférés par les SMUR à Necker. Lorsque le traumatisme n'implique ni atteinte cérébrale ou médullaire ni atteinte thoraco-pulmonaire, ils peuvent être pris en charge par une ou deux équipes chirurgicales viscérale et orthopédique dans un autre centre chirurgical de recours.

Tout dépend de la priorité chirurgicale des lésions : immobilisation de fractures, hémorragie intra-abdominale, hématurie, etc.

### ➤ Chirurgie orthopédique

Le nombre d'urgences orthopédiques à opérer en urgence absolue est plus restreint :

- Fractures et plaies profondes ouvertes ;
- Fractures de la palette humérale ;
- Lésions vasculo-nerveuses associées à une fracture ;
- Arthrite purulente de hanche chez le nourrisson ;

D'autres situations peuvent demander une intervention en urgence, tels que les brûlures de l'enfant, les morsures d'animaux, les plaies des mains, les cellulites extensives, les cheveux étranglants ou les œdèmes cutanés circonscrits et compressifs.

\*source : rapport du Professeur MERCIER